

登園許可書

【医師記載】

登園の際には、下記の登園許可書の提出をお願い致します。

(医師の診断により、登園可能と判断されることが基準となります。)

若松保育園	園長殿	【医師記載欄】
児童名 _____		
病名「 _____ 」		
_____年 _____月 _____日から病状も回復し、集団生活に支障がないと状態になったので、登園可能と判断します。		_____年 _____月 _____日
医療機関名 _____		
医師名 _____		印またはサイン

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、子ども達が一日快適に生活できるよう、下記の感染症については登園許可書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育園生活が可能な状態となつてからの登園するよう、ご配慮下さい。

感染症名	症状	登園の目安
麻疹 (はしか)	高熱とともに、鼻水や咳、結膜炎、頬の内側に白いボロボロが出現する。その 2~3 日後に全身に発疹が広がる。	解熱後 3 日を経過してから。
風しん (三日はしか)	38℃前後の熱と共に、全身に赤い発疹が現れる。首や耳の後ろのリンパ節が腫れる。妊婦が感染すると胎児に影響する危険がある。	発疹が消失してから。
水痘 (水ぼうそう)	発熱と共に、全身に痒みのある赤い発疹が広がり、水疱からかさぶたとなる。	全ての発疹が痂皮化 (かさぶた) になってから。
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	熱が出て、耳の下やあごの下が腫れる。	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になってから。
結核	微熱や咳、食欲不振が続く。	医師により感染の恐れがないと認められてから。
咽頭結膜熱 (プール熱) 【アデノウイルス】	夏風邪の一種で、高熱と目の痛み、結膜炎を併発する。	発熱、結膜の充血などの主な症状が消え 2 日経過していること。
流行性角結膜炎 (ハヤリ目)	目が充血して目やにや涙が増え、痛みを伴う	感染力が非常に強い為、結膜炎症状が消失してから。
百日咳	特徴的な激しい咳が長く続く。	特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了してから。
腸管出血性大腸菌感染症 (O157,O026,O111 等)	水のような激しい下痢や血便、腹痛が起こる。	症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されてから。
急性出血性結膜炎 (アポロ病)	エンテロウイルスによる急性結膜炎で、強い目の痛みや充血、結膜出血が特徴	医師により感染症の恐れがないと認められてから。
髄膜炎菌性髄膜炎	発熱、頭痛、嘔吐があり、急激に重症化する場合がある。	医師により感染の恐れがないと認められてから。